

# Soins bucco - dentaires DURANT le traitement



**Les traitements  
contre le cancer  
peuvent  
diminuer la  
production de  
salive**



© Dalhousie University

Les problèmes dentaires devraient être traités avant le début des traitements contre le cancer. Les résidents doivent être mis au courant des complications dentaires que peuvent apporter les traitements contre le cancer.

Les traitements peuvent causer la réduction des globules blancs qui aident le corps à combattre l'infection) ainsi que des plaquettes (qui aident à la coagulation du sang).

Lorsque le bilan sanguin est bas, utilisez une brosse ultra douce, soyez délicat lors du brossage et évitez d'utiliser la soie dentaire afin de prévenir les saignements. Aucun traitement dentaire ne devrait être fait durant cette période.

## **QUAND PROCURER DES SOINS BUCCO-DENTAIRES...**




*Les problèmes qui se développent lors du traitement contre le cancer, comme les chancres, la bouche sèche, le saignement, l'aphte, les changements dans le goût et l'appétit et le développement de cavités du à la bouche sèche*

- 1) Brosser les dents au moins 2X par jour en utilisant une brosse à dents ultra souple
- 2) Brosser à la suite de la prise de médicaments liquides, car ils peuvent contenir du sucre
- 3) Rincer avec de l'eau à la suite de vomissements; ne pas brosser pour une période de 30 minutes car l'émail est mou
- 4) Rincer avec un rince-bouche antibactérien non-alcoolisé
- 5) Appliquer du gel au fluor ou un rince-bouche gel une fois par jour et ne pas rincer pour 30 minutes
- 6) Garder la bouche et les lèvres humides (n'utilisez pas de lubrifiant à base de pétrole)
- 7) Utiliser un substitut de salive, gomme, rince-bouche et dentifrice selon la tolérance

## **CONSEILS**



Éviter les breuvages et les collations sucrés – LA GOMME À MÂCHER SANS SUCRE EST UN BON MOYEN D'AUGMENTER LE DÉBIT DE SALIVE

-  Surveiller les boissons aux fruits – elles ont une grande concentration de sucre et d'acide, ceux-ci pouvant endommager les dents
-  Boire du lait ou de l'eau – le thé et le café peuvent assécher la bouche
-  Brosser et/ou rincer la bouche avant de se coucher

## REFERENCES

Canadian Cancer Society's Steering Committee on Cancer Statistics. Canadian Cancer Statistics 2011. Toronto, ON: Canadian Cancer Society; 2011.

Heart and Stroke Foundation of Ontario. Management of dysphagia in acute stroke: an educational manual for the dysphagia screening professional. Toronto, ON: Heart and Stroke Foundation of Ontario; 2006 Jan.

Lazarus CL, Logemann JA, Pauloski BR, Rademaker AW, Larson CR, Mittal BB, Pierce M. Swallowing and tongue function following treatment for oral and oropharyngeal cancer. *J Speech Lang Hear Res* 2000;43:1011-23.

Miller M, Kearney N. Oral care for patients with cancer: a review of the literature. *Cancer Nursing* 2001;24(4):241-54.

Wilkins EM. *Clinical practice of the dental hygienist* 12th ed. Baltimore, MD: Lippincott, Williams & Wilkins; 2004.